



森とおる NEWS

森とおる
事務所発行

東京都豊島区上池袋3-46-2
東京都豊島区南大塚1-19-3

自宅 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-6-12 TEL 03(6912)0135

ワクチン接種 いつから？ どのように？



接種時期の予定

2月17日～	医療従事者ら（4万人）
3月中旬～	医療従事者ら（470万人）
3月下旬～	高齢者にクーポン券配布
4月中旬～6月末	高齢者に（3600万人）
その後	基礎疾患のあるひと（820万人） 高齢者施設などの職員（200万人）

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。米ファイザー製ワクチンは「20分の1にリスクを下げる」と言われています。しかし、絶対に感染しなくなるわけではありません。特に新型コロナウイルス変異株はワクチン効果が減る懸念があります。マスクについては、接種後も、自分は発症しなくても、ウイルスを持っていて、周りの人にうつす危険性がありますので着用が必要です。

副反応の報告

⑦症状別報告件数	
胃腸障害	
悪心・嘔吐（悪心）	1
悪心・嘔吐（嘔吐）	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
悪寒（悪寒）	2
異常感（異常感）	1
顔面腫脹（顔面腫脹）	1
発熱（発熱）	1
無力症（無力症）	1
冷感（冷感）	1
感染症および寄生虫症	
肺炎	1
筋骨格系および結合組織障害	
筋力低下（筋力低下）	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）	1
無呼吸（無呼吸発作）	1
喘息発作（喘息）	1
耳および迷路障害	
突発性難聴（突発性難聴）	1
傷害、中毒および処置合併症	
転倒（転倒）	1
心臓障害	
心肺停止（心肺停止）	1
神経系障害	
くも膜下出血（くも膜下出血）	1
四肢麻痺（四肢麻痺）	1
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	3
頭痛（頭痛）	1
頭部不快感（頭部不快感）	1
浮動性めまい（浮動性めまい）	2
皮膚および皮下組織障害	
そう痒症（そう痒症）	1
皮疹・発疹・紅斑（発疹）	1
蕁麻疹（蕁麻疹）	2
免疫系障害	
アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）	2
過敏症（過敏症）	3
総計	35

いつから接種？

左上の表に示しましたが、2月から4月までは新型コロナウイルスの診療に関わる医療従事者らがワクチン接種を受けています。（3月22日時点、1回接種62万人、2回接種3万人）

高齢者（一九五七年四月一日以前に生まれた方）への接種は4月中旬から6月にかけて行われる予定です。

高齢者が終わると、基礎疾患のある人らと、高齢者施設で働く職員らへの接種を開始します。

その後は、60～64歳、16歳～59歳の順になります。早くても7月以降になりそうです。

郵送でクーポン券が届い

いつから接種？

左上の表に示しましたが、2月から4月までは新型コロナウイルスの診療に関わる医療従事者らがワクチン接種を受けています。（3月22日時点、1回接種62万人、2回接種3万人）

高齢者（一九五七年四月一日以前に生まれた方）への接種は4月中旬から6月にかけて行われる予定です。

高齢者が終わると、基礎疾患のある人らと、高齢者施設で働く職員らへの接種を開始します。

その後は、60～64歳、16歳～59歳の順になります。早くても7月以降になりそうです。

持病があつて接種すべき

接種は強制か？

厚生労働省は、「接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集している」内容を公表しています。右の表は、3月7日時点の公表結果です。

3月1日、60代女性がワクチン接種後にくも膜下出血で死亡したことが報告されていますが因果関係は評価不能で偶発事例ではとされています。

接種を受けるかどうかは、こうした公表内容などを把握し理解した上で判断していかなければなりません。

持病があつて接種すべき